

1 يُولد بعض الأطفال بشفاة مشقوقة (فتحة , ثغرة أو شق) أو فتحة في سقف الحلق (يمكن أن تكون غير مرئية من الخارج).



2 يكون التدخل الجراحي في هذه الحالة في غاية الأهمية، لأنه بدونها قد لا يستطيع الطفل التحدث جيدا ويعاني من مشاكل في تناول الطعام أو شرب الحليب , وقد يكون عرضه للإصابة بالأمراض بنسبه عالية .

4 كي يتمتع طفلك بصحة جيدة وكي يكون قويًا قادرا لإجراء العملية، من الضروري إرضاع الأطفال الذين يعانون من وجود هذا الشق بكميه كافي.



3 تستطيع العمليات الجراحية في سمايل ترين معالجة هذا القصور دون أي مقابل مادي في أي مستشفى تتعامل مع سمايل تراين؛ حيث أن العملية الجراحية هي الوسيلة الوحيدة القادرة على معالجة هذا القصور.



5 في بعض الأحيان، يكون من الصعب إرضاع الأطفال الذين يعانون من وجود هذا الشق؛ حيث يخرج الحليب من أنفهم أو يدخل إلى رنتهم أو يملئ الهواء معدتهم فيشعرون بالشبع وينامون دون أن يحصلوا على الكمية الكافية من الحليب



6

من الضروري أن يحصل الطفل على غذاءٍ صحي حتى يستطيع الخضوع للعملية الجراحية. وعلى الام الالتزام برضاعه طفلها بما يلائم حالته. ويفضل استخدام الرضاعة الطبيعية ان امكن مع مراعاة ما يلي:



إرضاع الطفل ومساعدته على التحشؤ عدد من المرات أكثر من المعتاد.

الضغط برفق على الثدي لزيادة تدفق الحليب.

وضع حلمة الثدي في الجانب الذي ليس به الشق.

إرضاع الطفل وهو جالس في وضع مستقيم.

7

إذا لم يكن الإرضاع من الثدي ممكناً، على الأم أن تستمر في إرضاع طفلها مستخدمة وسائل أخرى، وبعض هذه الوسائل هي:



تكبير ثقب حلمة الزجاج قليلاً لزيادة تدفق الحليب.

يمكن للأم أن تشفط الحليب من ثديها ثم ترضع الطفل باستخدام ملعقة أو زجاجة.

8

إن لم يكن الحليب الطبيعي متوفراً ، تستطيع الأم استخدام حليب الأبقار أو الحليب الناشف مع الحرص على أن يغلى الحليب و الماء المستخدم مع الحليب الناشف(على أن يتم تبريده).




لتأكد من أن الأدوات التي ستستخدم في الرضاعة نظيفة ومعقمة عن طريق غليها على الأقل لمدة 10 دقائق. الملاعق غير النظيفة أو الزجاجات قد تسبب إصابة الطفل بالحمى والأمراض الأخرى.

9



ضرورة اصطحاب أطفالكم الى أقرب مركز من مراكز سمايل ترين حيث سيقوم الطبيب بالفحص الطبي لإعلامكم بموعد العملية الجراحية.

10



العلاج الموجود في أي مركز من مراكز سمايل ترين مجاني بدون أي مقابل